

PIRIMAXX[®]



55 EC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Pirimiphos Methyl
Registro Digesa: RD N°0819-2023/DCEA/DIGESA/SA
Formulación: Concentrado emulsionable (EC)
Uso: Insecticida para uso en Salud Pública e Industrial

MODO DE ACCIÓN

PIRIMAXX 55 EC es un insecticida organofosforado de amplio espectro, elimina todo tipo de insectos por contacto, ingestión e inhalación (acción fumigante), es efectivo en el control profesional de mosquitos y cucarachas.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

METODO DE EMPLEO

PIRIMAXX 55 EC Puede ser aplicado tanto en tratamientos espaciales como superficiales. En aplicaciones espaciales, puede ser aplicado empleando cualquier equipo de pulverización, incluso con Ultra Bajo Volumen (Neblina fría) y equipos Termonebulizadores (Neblina caliente), diluyéndolo en agua o en petróleo según sea el caso. En tratamientos superficiales, dirigir uniformemente el rociado sobre las superficies infestadas o aquellas que se deseen proteger, como paredes, pisos (asfaltados o no), techos, rendijas, canaletas, desagües y lugares que sirvan de refugios a las plagas

AMBITO DE APLICACIÓN

PIRIMAXX 55 EC es ideal para ser para el control de las plagas en las superficies de los pisos de los almacenes vacíos, sin estar en contacto con los alimentos, aplicar en las superficies de techos y paredes, y rendijas.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Usar máscara, lentes, guantes y ropa protectora.
- Causa moderada irritación a los ojos.
- Evite el contacto con los ojos y la piel y la inhalación del producto.
- No aplicar en presencia de personas o animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos, medicinas y agua para consumo humano.
- Después de la aplicación, bañarse con abundante agua y jabón.
- Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar el producto en un área seca y bien ventilada, donde no se presenten temperaturas extremas.

Fecha de actualización: Febrero, 2023

- Mantener en los envases originales, herméticamente cerrados y lejos de alimentos, bebidas y medicinas. No transportar junto a alimentos o medicinas.
- Tóxico para peces. Evite la contaminación de las diferentes fuentes de agua y desagüe con el producto o restos del preparado.

PRESENTACIONES

45 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 3 L

RECOMENDACIONES DE DOSIS

Para el control de plagas domésticas, en industrias y de importancia en Salud Pública.

Plagas objetivo	Nombre científico	Tratamiento	Equipos	Dosis (ml/L)
Cucarachas	<i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i>	Residual	Equipos aspersores	8 – 10 ml/L
Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	Espacial	Motomochilas (con ULV)	8 – 10 ml/L
			Termonebulizadores	8 – 10 ml/L agua ó diesel

INDICACIONES DE USO

PIRIMAXX 55 EC es efectivo en el control profesional de mosquitos y cucarachas.

Fecha de actualización: Febrero, 2023