

TAXAT[®]



PELLET

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Brodifacoum 0.005% p/p
Registro Digesa: RD N° 3077-2020/DCEA/DIGESA/SA
Formulación: Cebo en Pellets
Uso: Rodenticida para uso en Salud Pública e Industrial

MODO DE ACCIÓN

TAXAT PELLET Este producto es el rodenticida anticoagulante de segunda generación, que tiene la doble ventaja del rodenticida agudo y crónico. Puede utilizarse como raticida agudo y en dosis única para controlar plagas. También se puede utilizar en pequeñas y múltiples dosis para lograr el propósito de una mejor eliminación de los roedores. El producto tiene una buena palatabilidad, no produce un efecto antialimentario y puede matar eficazmente a los roedores resistentes al anticoagulante de primera generación. El efecto toxicológico es similar al de otros anticoagulantes, principalmente para dificultar la síntesis de protrombina, dañar los capilares y causar la muerte por sangrado. La administración saturada puede controlar el daño a los roedores.

COMPATIBILIDAD

Ninguno conocido.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: LIGERAMENTE PELIGROSO

METODO DE EMPLEO

Colocar el **TAXAT PELLET**, en los comederos y cubrirlos, pues los roedores comen en lugares protegidos. Ubicar puntos de cebado (cebaderos) cada 5 metros. De preferencia disponer el producto dentro de cajas o tubos cebaderos sin necesidad de removerlos del envase, para así evitar que niños y animales puedan ingerir accidentalmente el producto. Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los sachet o bolsas consumidos cada 7 días, hasta que cese el consumo.

AMBITO DE APLICACIÓN

TAXAT PELLETS es ideal para ser usado en ambientes cerrados como viviendas, hoteles, restaurantes, hospitales, colegios, oficinas, mercados, industrias y almacenes de alimentos, instalaciones pecuarias, etc.

Fecha de actualización: marzo de 2021

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- El producto es tóxico y debe manejarse estrictamente. Una vez que se coloca el medicamento, se debe evitar la entrada de aves de corral y ganado, y se debe evitar que los organismos benéficos coman por error.
- Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos y limpie la piel expuesta inmediatamente después de manipular el medicamento.
- Las ratas muertas y el resto del medicamento deben quemarse o enterrarse.
- Use guantes, mascarillas y otros equipos de protección cuando aplique; Evite el contacto con mujeres y mujeres en período de lactancia.
- Los envases usados deben desecharse adecuadamente y no deben usarse para otros fines, ni deben desecharse a voluntad.

PRESENTACIONES

Sachet trilaminado de 10 g
Sachet trilaminado de 25 g
Sachet trilaminado de 50 g
Sachet trilaminado de 100 g
Sachet trilaminado de 500 g
Caja de cartón de 100 g
Caja de cartón de 250 g
Caja de cartón de 500 g
Caja de cartón de 1Kg
Caja de cartón de 2Kg
Balde de 5Kg
Balde de 10Kg

INDICACIONES DE USO, DOSIS Y RECOMENDACIONES

El brodifacoum actúa una vez que el roedor ha ingerido parte del cebo.

Plaga	Dosis y Recomendaciones
RATA (<i>Rattus Norvegicus</i>)	11.12 gr de TAXAT PELLETT / punto de cebado
	11.2 gr de TAXAT PELLETT / distancia entre cebaderos: 5 mt

Fecha de actualización: marzo de 2021