



FITOFORTEX[®]

ACTIVA LAS DEFENSAS DE TUS PLANTAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Uso: Inductor de las defensas naturales de las plantas

FITOFORTEX es un fertilizante foliar líquido, propicia la formación de sustancias naturales de las plantas (fitoalexinas).

Composición	g/L
Fosfito de Potasio	840
Fosforo (P ₂ O ₅)	490
Potasio (K ₂ O)	350
Aditivos	c.s.p 1L

MODO DE ACCIÓN

FITOFORTEX actúa como activador de la defensa natural de las plantas, las fitoalexinas, estas propician la creación de autodefensas y fortalecimiento frente a enfermedades fúngicas, independiente de la forma de aplicación, este posee acción sistémica ascendente, el contenido de fósforo (P) y potasio (K) tienen gran actividad nutricional en momentos de floración, cuajado y maduración.

BENEFICIOS

- **FITOFORTEX** es un inductor de resistencia y fertilizante foliar sistémico.
- Garantiza la máxima asimilación de fósforo y potasio, previniendo y corrigiendo su deficiencia.
- Respuesta rápida y prolongada en las etapas de producción del cultivo.
- Asegura su inversión.

COMPATIBILIDAD

FITOFORTEX no debe mezclarse con productos cúpricos. Es compatible con productos de uso común, sin embargo, se recomienda hacer pequeñas pruebas antes de proceder a su mezcla con otros productos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda aplicar **FITOFORTEX** en pulverizaciones foliares.

Fecha de actualización: enero de 2021

Elaborado por el Área de Registros

METODO DE EMPLEO

FITOFORTEX está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento.

PRESENTACIONES

Frasco x 1.0 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIÓN
	L/Cil 200 L	L/Ha	
Papa, tomate, ají paprika	0.5	1	Aplicar al inicio de la floración y fructificación, realizando las aplicaciones con intervalos de 10 días. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Cebolla, ajo, poro	0.5	1	Aplicar después de los 60 días de la siembra/transplante con un máximo de 3 aplicaciones con intervalos de 15 días. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Col, coliflor, brócoli	0.5	1	Aplicar después de los 60 días de la siembra/transplante con un máximo de 3 aplicaciones con intervalos de 15 días. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Esparrago, algodón, marigold	0.5	1	Aplicar a partir de los 90 días de la siembra con un máximo de 3 aplicaciones con intervalos de 15 -20 días. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Maíz, arroz	0.5	1	Aplicar en maíz a la formación de la muñeca y en arroz al inicio del punto de algodón y repetir al llenado del grano. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Sandia, zapallo, pepinillo	0.5	1	Aplicar al inicio de la floración y al cuajado de frutos, repetir esta aplicación con intervalos de una floración. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Ornamentales (flores)	0.5	1	Aplicar desde el inicio de la floración hasta antes de la cosecha con intervalos de 15 días. Dosis en mochila: 50 ml/20L.

Fecha de actualización: enero de 2021

Elaborado por el Área de Registros

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIÓN
	L/Cil 200 L	L/Ha	
Vid	0.5	1	Aplicar desde la formación del racimo repitiendo cada 15 días. Se debe aplicar en forma dirigida al racimo. Dosis en mochila: 50 ml/20L.
Frutales	0.5	1	Se puede aplicar desde la primera floración, con mayor énfasis cuando empiece a formarse los frutos hasta antes de la cosecha con intervalos de 15 días. Dosis en mochila: 50 ml/20L.

Fecha de actualización: enero de 2021

Elaborado por el Área de Registros