

HOT!

(P-Ca)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

HOT! es un fertilizante que cubre las necesidades nutricionales de calcio en todo tipo de cultivos. **HOT!** es absorbido por las hojas, siendo necesario el adecuado cubrimiento del follaje para asegurar la asimilación del producto, también actúa inhibiendo la biosíntesis de giberelinas en la planta, produciendo la reducción del tamaño en los nuevos brotes, mejorando la penetración de luz solar en la parte interna de los árboles, aumentando los nutrientes para la formación y desarrollo de los frutos.

Composición	g/Kg
Prohexadiona de calcio	275.0
Inertes	c.s.p. 1Kg

PROPIEDADES

HOT! está compuesto de Prohexadiona de calcio al 27.5%, el cual ayuda a reducir el crecimiento vegetativo de nuevos brotes, dando el balance adecuado entre el desarrollo del follaje y la producción de frutos contribuyendo a una buena producción durante la vida productiva de la planta. Promueve la fertilidad, controlando el tiempo de floración, mejorando el establecimiento de frutos y maduración. La disminución del crecimiento vegetativo es de 2 a 5 semanas después de la aplicación. La aplicación de forma temprana y de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta producen mejor retención de frutos, una homogeneidad en el tamaño y diámetro del fruto lo que se traduce en un incremento del rendimiento y calidad del fruto.

El uso de **HOT!** tiene la ventaja de producir efectos que no son permanentes y por lo tanto, de ser modificados de acuerdo a las necesidades del agricultor.

COMPATIBILIDAD

HOT! es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común, no se recomienda las aplicaciones de ácido giberélico y fertilizantes con calcio, se deben aplicar 4 a 5 días antes o después de la aplicación de **HOT!** y bajo ninguna circunstancia juntos en mezcla.

La prohexadiona de calcio no requiere acidificar es hidrolíticamente estable a pH neutro. Si el agua de la aplicación tiene altos niveles de carbonato de calcio (aguas duras) se recomienda el uso de ablandadores. Para la mezcla con otros foliares se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa protectora adecuada. No aplicar en presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor hacer las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a las altas temperaturas.

Fecha de actualización: agosto del 2023

Elaborado por el Área de Registros

PRESENTACIONES

Bolsa 1 Kg
Bolsa 5 Kg
Bolsa 20 Kg

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIÓN
	g/ha	g/100 L	
Palto ¹	1000	100	Aplicar con los brotes entre 5-20 cm de longitud. Realizar una segunda aplicación entre los 20 - 30 días después de la primera (un máximo de 2 aplicaciones por temporada).

¹ Tasa basada en diluir el volumen de agua de 1000 L/ha.

Fecha de actualización: agosto del 2023

Elaborado por el Área de Registros