

VESPA®

70 WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Propineb 700 gr/Kg
Registro Senasa: PQUA Nº 2811- SENASA
Titular de registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C
Formulación: Polvo mojable (PM)
Uso: Fungicida de uso agrícola
Formula química: $C_5H_8N_2S_4Zn$
Familia química: Ditiocarbamato
Grupo FRAC: MO3
Propiedades fisicoquímicas

MODO DE ACCIÓN

VESPA®70 WP ejerce su efecto en los hongos por contacto y su mayor efecto lo logra al ser aplicado de manera preventiva. **VESPA®70 WP** actúa inhibiendo la germinación de las esporas de los hongos y acaba con las estructuras de reproducción. Interviene en la respiración de los hongos, inactivando el sistema de deshidrogenada pirúvica. Su acción es principalmente durante la germinación de los esporangios y zoosporas, así como en el desarrollo miceliar inactivando aminoácidos o procesos bioquímicos importantes que involucran enzimas con grupos tioles. **VESPA®70 WP** afecta múltiples procesos metabólicos de los hongos. Impide la actividad de las enzimas sulfhídricas y de la cisteína, causa una disrupción de la actividad respiratoria, irrumpe el ciclo de Krebs y la formación de ATP.

COMPATIBILIDAD

VESPA®70 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: LIGERAMENTE PELIGROSO

Toxicidad oral: DL50 (rata) > 5000 mg/kg
Toxicidad dérmica: DL50 (rata) > 2000 mg/kg
Toxicidad por inhalación: LC50 > 5 mg/L

Fecha de actualización: Abriel del 2023

Elaborado por el Área de Registros

METODO DE EMPLEO

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

VESPA®70 WP puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, puede repetirse la aplicación entre 7 y 14 días.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico.

PRESENTACIONES

Bolsa x 1 Kg
 Bolsa x 10 Kg
 Bolsa x 20 Kg
 Bolsa x 40 Kg
 Bolsa x 50 Kg

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/200L		
Papa	Rancha, Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	500	7	0.05
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	500	30	0.5
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 -1000	30	0.5

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

Fecha de actualización: Abriel del 2023

Elaborado por el Área de Registros