

ROCKET[®] 70 WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Imidacloprid (700 g/L)
Registro Senasa: PQUA N° 1211 – SENASA
Titular del registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C
Formulación: Polvo Mojable (WP)
Uso: Insecticida de uso agrícola
Formula química: C₉H₁₀ClN₅O₂
Familia química: Neonicotinoides
Grupo IRAC: 4A
Propiedades fisicoquímicas
Solubilidad: En agua 0.61 g/L a 20°C.
Presión de vapor: 4 x 10⁻¹⁰ Pa m³ a 20 °C [Ingrediente activo]
Coefficiente de partición Kow: log P = 0.57 a 21 °C

MODO DE ACCIÓN

ROCKET 70 WP es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulo en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo que resulta en la parálisis y posterior muerte de los insectos.

COMPATIBILIDAD

Debido a su especificidad se recomienda aplicar solo con un surfactante sin mezcla con otros plaguicidas.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

DL50 Oral Aguda	:	DL50 ratas > 2 000 mg/kg
Dermal Aguda	:	DL50 ratas > 4 000 mg/kg
CL50 inhalatoria	:	CL50 ratas > 16.85 mg/L aire
Irritación dermal	:	No irritante a la piel de conejo
Irritación ocular	:	Levemente irritante a los ojos de conejo

MÉTODO DE EMPLEO

ROCKET 70 WP puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **ROCKET 70 WP** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa, sin grumos. Adicionar más agua revolviendo continuamente y agregar este preparado al tanque de aplicación, el cual contiene el resto del agua, a través de una malla o cedazo. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto mantener en marcha el sistema de agitación. Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso.

Fecha de actualización: enero del 2024

Elaborado por el Área de Registros

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomiendan de 1 a 2 aplicaciones por campaña como máximo, dependiendo del grado de infestación de la plaga.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto.
- Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento.
- No utilice la boca para destapar boquillas.
- No lave equipos en fuentes de agua.
- No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico.
- Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Bolsa de 1 Kg
Bolsa de 500 g
Bolsa de 250 g
Bolsa de 50 g

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/200L		
Vid	Filoxera	<i>Viteus vitifoliae</i>	50	21	1

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

ppm: partes por millón

Fecha de actualización: enero del 2024

Elaborado por el Área de Registros