

SUSTENTO®

:.20-20-20

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

SUSTENTO 20-20-20 es un nutriente foliar con una equilibrada concentración de nitrógeno, fósforo y potasio, enriquecido con carboxylatos y extractos vegetales que aseguran una nutrición complementaria en todas las etapas del desarrollo del cultivo.

SUSTENTO 20-20-20 previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por deficiencia de Nitrógeno, Fosforo y potasio.

Uso: Aportador de nutrientes de alta asimilación para uso foliar.

Composición	% p/v
Carboxylatos y extractos vegetales como Carbono Orgánico Oxidable	5.00
Nitrógeno (N)	20.00
Fosforo (P ₂ O ₅)	20.00
Potasio (K ₂ O)	20.00

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Estado: Líquido

Color: Café

Olor: Característico

pH: 6.5

Densidad: 1.36 g/ml a 25 °C

MODO DE ACCIÓN

SUSTENTO 20-20-20 estimula el desarrollo vegetativo, floración y fructificación en la planta, el aumento de la actividad fotosintética asegura una mayor y mejor producción en los cultivos, estimulando el sistema radicular mejora la calidad y rendimiento incluso en temperaturas extremas.

COMPATIBILIDAD

No mezclar **SUSTENTO 20-20-20** con productos con alcalinos ni ácidos; sin embargo, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

Fecha de actualización: Febrero del 2024

Elaborado por el Área de Registros

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda aplicar **SUSTENTO 20-20-20** en pulverizaciones foliares.

PERIODO DE INGRESO

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

METODO DE EMPLEO

SUSTENTO 20-20-20 está formulado para aplicarse por aspersion foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento.

PRESENTACIONES

Frasco x 1 L
Galón x 4 L
Bidón x 20 L
Cilindro x 200 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS	MOMENTOS Y NÚMERO DE APLICACION
	L/Ha	
Alcachofa	1 - 2	- Aplicar a los 15 días después del transplante. - Al inicio de formación del capítulo.
Algodón	1 - 2	- Aplicar a los 12 días después del deshiije. - Al inicio de la formación de los botones.
Ají, Páprika y Piquillo	1 - 2	- Aplica cuando la planta tiene 6 hojas verdaderas. - Al inicio de floración.
Arroz	1 - 2	- Aplicar a los 6 días después del transplante. - En el punto de algodón. - Al inicio del desarrollo del grano.
Cebolla y Ajos	1 - 2	- Aplicar a los 12 días después del transplante. - Al inicio de la bulbificación.
Espárrago	1 - 2	- Aplicar en el primer brotamiento. - Al inicio del segundo brotamiento. - A los 25 días antes del chapodo.
Palto, Mango Olivo y Cítricos	2 - 4	- Aplicar al inicio del brotamiento. - Al inicio del desarrollo del fruto. - Después de la cosecha.
Vid	1 - 2	- Aplicar al inicio del brotamiento. - Al inicio del crecimiento de las bayas. - Antes del envero.
Papa	2 - 4	- Aplicar a los 12 días después del brotamiento. - Antes del aporque.

Fecha de actualización: Febrero del 2024

Elaborado por el Área de Registros

FICHA TÉCNICA

Tomate	2 - 3	- Aplicar cuando la planta tiene 6 hojas verdaderas. - A los 15 días después de la primera aplicación.
Frijol, Arveja, Holantao	1 - 2	- Aplicar cuando el cultivo tenga cuatro hojas verdaderas. - En pleno desarrollo de las vainas.

Fecha de actualización: Febrero del 2024
Elaborado por el Área de Registros