



# VALORO<sup>®</sup>

## 250 SC

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Paclobutrazol 250 g/L

**Registro Senasa:** RCP N° 022-SENASA

**Titular de registro:** INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C

**Formulación:** Suspensión concentrada (SC)

**Uso:** Regulador de crecimiento

**Formula química:** C<sub>15</sub>H<sub>20</sub>ClN<sub>3</sub>O

**Familia química:** Triazol

**Propiedades fisicoquímicas**

**Solubilidad:** 22.9 mg/L a 20 °C en agua pura.

**Presión de vapor:** 1.9 x 10<sup>-6</sup> Pa a 20°C

**Coefficiente de Particion Octanol-Agua:** Log Pow: 3.11 a 20 °C

### MODO DE ACCIÓN

**VALORO 250 SC** es un regulador del crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelinas (hormona responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de los frutos cuajados de palta.

### COMPATIBILIDAD

Debido a la naturaleza de la aplicación no se recomienda mezclar **VALORO 250 SC** con ningún otro tipo de producto.

### CATEGORIA TOXICOLOGICA: LIGERAMENTE PELIGROSO

### METODO DE EMPLEO

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas o enfermas.

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Realizar 1 aplicación por campaña. Considerando una campaña/año.
- Como máximo aplicar 6.0 L/ha.

Fecha de actualización: Enero del 2024

Elaborado por el Área de Registros



- Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.
- No aplicar en plantas enfermas, ni con estrés por falta de humedad.

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice equipo de protección (pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos). No aplique el producto en dirección contraria al viento. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice la botella de plástico del producto para uso doméstico. Realice el triple lavado en los envases vacíos y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego pefore el envase para inutilizarlo.

## PRESENTACIONES

Cilindro de 200  
Envase de 20 L  
Envase de 5 L  
Frasco de 1 L

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		%	(L/Ha)		
Palto	Aplicar en la época de floración, cuando se tenga entre el 60-80% de floración. En pulverizaciones de gotas finas en forma de lluvia o rocío, dirigidos a los brotes.	0.8 - 1.0	6.0	180	0.5

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

Fecha de actualización: Enero del 2024

Elaborado por el Área de Registros