



FANTASTIC®

200 SC

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Fipronil (200 g/L)
Registro Senasa: PQUA N° 377 - SENASA
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Uso: Insecticida de uso agrícola
Formula química: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
Familia química: Fenilpirazoles
Grupo IRAC: 2B
Propiedades fisicoquímicas
Solubilidad: 3.78 mg/L
Presión de vapor: 0.002 mPa
Coefficiente de Particion Octanol-Agua: 3.75

MODO DE ACCIÓN

FANTASTIC 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

COMPATIBILIDAD

FANTASTIC 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

LD ₅₀ /oral/ratas (mg/Kg):	92
LD ₅₀ /dérmica/ratas (mg/Kg):	103
CL ₅₀ /Inhalatoria (mg/L):	> 0.682
Irritación en la piel:	No irritante a la piel.
Irritación ocular:	No es irritante a los ojos.
Sensibilización:	No hay datos

MÉTODO DE EMPLEO

FANTASTIC 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. **FANTASTIC 200 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros



FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto.
- Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento.
- No utilice la boca para destapar boquillas.
- No lave equipos en fuentes de agua.
- No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico.
- Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Cilindro de 200 L

Frasco de 1 L

Frasco de 500 ml

Frasco de 250 ml

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	ml/200L		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	21	0.005
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	100 - 250	51	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	250	14	0.02

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

ppm: partes por millón

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros