

FUNDAMENTAL 73 WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Benalaxyl 80 g/Kg + Mancozeb 650 g/Kg

Registro Senasa: PQUA N° 199 - SENASA

Formulación: Polvo mojable (WP)

Uso: Fungicida de uso agrícola

Formula química: $C_{20}H_{23}NO_3$ (Benalaxyl); $(C_4H_6MnN_2S_4)_x(Zn)_y$ (Mancozeb)

Familia química: Acylalanines (Benalaxyl); Ditiocarbamato (Mancozeb)

Grupo FRAC: 4 (Benalaxyl); MO3 (Mancozeb)

Propiedades fisicoquímicas

Solubilidad: 28.6 mg/L (Benalaxyl); 6.2 mg/L (Mancozeb)

Presión de vapor: 0.572 mPa (Benalaxyl); 0.013 mPa (Mancozeb)

Coefficiente de Partición Octanol-Agua: 3.54 (Benalaxyl); 2.3 (Mancozeb)

MODO DE ACCIÓN

FUNDAMENTAL 73 WP es un fungicida sistémico con actividad preventiva y curativa. **FUNDAMENTAL 73 WP** se caracteriza por tener actividad selectiva sobre el grupo de los peronosporales, tanto de los que tienen comportamiento saprofita (*Phytium*), parásitos semiobligados (*Phytophthora infestans*) y parásitos obligados (*Plasmopara viticola*, *Peronospora tabacina*). Sobre los primeros, detiene el crecimiento micelial y sobre los segundos, actúa de diversas formas: inhibiendo el desarrollo del micelio en los tejidos de la planta huésped, impidiendo la liberación de zoosporas y evitando su germinación.

COMPATIBILIDAD

FUNDAMENTAL 73 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Ratas: | Oral LD50 >1000 mg/kg |
| Conejo: | Dermal LD50 >2000 mg/kg |
| Ratas: | Inhalado CL50 >5mg/L (4 horas) |
| Irritación ocular: | Medianamente irritante para la piel. |
| Irritación en la piel: | Medianamente irritante a los ojos. |
| Sensibilización: | Sin datos. |

METODO DE EMPLEO

Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se deben iniciar los tratamientos cuando las condiciones climatológicas sean favorables para el desarrollo del patógeno y repetir con un intervalo mínimo de 7 días dependiendo del grado de infección.

Número máximo de aplicaciones por campaña: Se recomienda un máximo de dos aplicaciones por campaña.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Tambor de 25 Kg
Envase de 1 Kg
Envase de 500 g
Envase de 200 g

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| | Nombre común | Nombre técnico | g/ 200L | Kg/ha | | |
| Papa | Rancha, Hielo fungoso | <i>Phytophthora infestans</i> | 500 | 1 - 2 | 28 | 0.02*/ 0.2** |
| Cebolla | Mildiu | <i>Peronospora destructor</i> | 500 | 1 | 28 | 0.2*/ 0.5** |
| Pimiento | Tizón temprano, mancha foliar | <i>Alternaria solani</i> | 750 | 1.5 | 7 | 0.2*/ 1** |
| Vid | Mildiu | <i>Plasmopara viticola</i> | 300 - 400 | 1.5 - 2 | 30 | 0.3*/ 5** |

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

Benalaxyl *, Mancozeb **

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros