

Greencal

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Greencal es un producto formulado, a partir de un extracto puro de algas, cuyo contenido de manitol y ácido algínico tiene un potente efecto bioestimulante. Además, posee calcio y boro para reforzar las paredes celulares, mejorando la firmeza y vida útil del fruto.

El extracto de macroalgas empleado es obtenido mediante bajas temperaturas y ruptura de células, extrayendo los componentes activos naturales presentes en el alga *Ascophyllum nodosum*.

Greencal es compatible con la producción agrícola orgánica, según los requerimientos de los reglamentos de la Unión Europea N° 2018/848 y 2021/1165 y Estados Unidos (USDA/NOP).

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Extracto de algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	75% p/v
Calcio (CaO)	9.6% p/v
Boro (B)	0.28% p/v
Manitol	0.48% p/v
Ácido algínico	7.2% p/v
Polisacáridos totales	0.084% p/v

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Estado: Líquido

Color: Verde

Olor: Característico

pH: 4.5 -5.5

Densidad: 1.27 g/cm³

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. Se recomienda hacer prueba de compatibilidad en la solución. No mezclar con ácidos/bases fuertes.

Fecha de actualización: Mayo del 2026

Elaborado por el Área de Registros

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda aplicar en pulverizaciones foliares y/o riego por goteo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

METODO DE EMPLEO

Aplicar vía foliar en condiciones climáticas favorables y mediante sistema de riego en suelo, preferiblemente por la mañana para maximizar la absorción.

PRESENTACIONES

Botella x 1 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS		MOMENTOS DE APLICACIONES
	(L / 200 L)	(L / ha)	
Cítricos	0.5	2 - 3 L	Al inicio de brotación y antes del cuajado y engorde de fruto. Aplicar en cada etapa, repetir cada 15 días.
Frutales de hueso y pepita	0.5	2 - 3 L	Al inicio de brotación y antes del cuajado y engorde de fruto. Aplicar en cada etapa y repetir cada 15 días.
Hortalizas	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2 L	Realizar 2 - 5 aplicaciones cada 7 - 10 días.
Uva	0.3	2 - 3 L	Aplicar en Pre - floración e inicio del cuajado.
Palto	0.3	3 - 4 L	Iniciar aplicaciones en Pre - flor y antes del cuajado. Aplicar en cada etapa y repetir cada 15 días.
Arándano	0.5	2 L	Iniciar en prefloración y repetir al inicio del cuajado. Aplicar en cada etapa y repetir cada 7 días.
Papa	0.5	1.5 L	Inicio de tuberización y repetir cada 15 días hasta en dos oportunidades más.
Arroz	1.0	1 L	Aplicar en "punto de algodón" y repetir a los 10 días.

En fertirrigación: aplicar 2 - 3 L/ha, realizando de 3 - 5 aplicaciones durante el periodo de crecimiento.

Fecha de actualización: Mayo del 2026

Elaborado por el Área de Registros