



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Uso: ACTIVADOR DE MECANISMOS DE AUTODEFENSA

KINERGY es un extracto de proteínas de origen vegetal que estimula la producción de sustancias de autodefensa de amplio espectro aprovechando el propio potencial genético de la planta, logrando incrementar su auto protección natural contra efectos adversos originados por condiciones ambientales adversas como por patógenos.

KINERGY es un complemento a las buenas prácticas agrícolas, por ello para un adecuado efecto del producto es recomendable que la planta se encuentre en óptimo estado nutricional, para reforzar el proceso de síntesis de sustancias de autodefensa se recomienda acompañar la aplicación con un bioestimulante.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Estado: Líquido
Color: Marrón oscuro
pH: 4 - 6
Densidad: 1.1 g/ml

Composición	%
Proteínas inactivas	1
Ac. Fúlvicos	3
Emulsificantes	2
Aditivos	c.s.p 1L

COMPATIBILIDAD

KINERGY es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común, no se recomienda su uso asociado con productos de reacción alcalina.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KINERGY puede ser aplicado en pulverizaciones foliares y al suelo, con cualquier equipo convencional terrestre que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Debido a que el producto no está considerado como peligroso, no procede su clasificación como tal. Use equipo de protección básico para su manipulación.

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros

PRESENTACIONES

Frasco de 1 L

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIÓN
	L/cil 200L	L/Ha	
Arróz	-	0.5	1ra aplicación 10 días antes del trasplante y luego a los 7 y 14 días del trasplante.
Capsicums	-	0.5 - 0.75	Aplicar una semana antes del trasplante y luego aplicaciones semanales
Alcachofa	-	0.5 - 0.75	Aplicar una semana antes del trasplante y luego aplicaciones semanales.
Tomate	0.5	0.75	Aplicar una semana antes del trasplante y luego aplicaciones semanales.
Papaya	-	0.75	Aplicaciones semanales.
Zapallo, Melón, Sandía, Otros	0.5	0.75	Dosis de 0.5 L/ha en plantas jóvenes y 0.75 L/ha en plantas desarrolladas en etapa vegetativa.
Palto, vid	-	0.5 - 0.75	Se recomienda 2 aplicaciones después de realizar la poda y una segunda aplicación luego de 15 días.

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros