

Revelacion[®]

40WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Myclobutanil (400g/Kg)

Registro Senasa: PQUA N° 469 – SENASA

Formulación: Polvo mojable (WP)

Uso: Fungicida de uso agrícola

Formula química: C₁₅H₁₇ClN₄

Familia química: triazoles

Grupo FRAC: 3

Propiedades fisicoquímicas (ingrediente activo):

Solubilidad: 132 mg/L

Presión de vapor: 0.198 mPa

Coefficiente de Partición Octanol-Agua: 2.89

MODO DE ACCIÓN

REVELACION[®] 40 WP tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante de enfermedades fungosas susceptibles. Su acción afecta la síntesis de la membrana celular; causa la muerte del haustorio (micelio de penetración), tan pronto como es emitido. En infecciones presentes detiene el crecimiento del micelio, y así también previene la esporulación por la muerte temprana del micelio, impidiendo la colonización del hongo, el avance de la infección en los tejidos, y su posterior dispersión.

Las principales características agrícolas de **REVELACION[®] 40 WP** son:

- Posee acción curativa contundente que inhibe el crecimiento del micelio.
- Prolongada acción residual.
- Crea una zona de alta concentración cerca al sitio de entrada que no se diluye por crecimiento, manteniendo el control por más tiempo.

COMPATIBILIDAD

REVELACION[®] 40 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: LIGERAMENTE PELIGROSO

DL50 Oral Aguda (ratas): >500 mg/kg

DL50 Dermal Aguda (conejos): > 1000 mg/kg

CL50 inhalatoria (ratas): > 5 mg/L aire (4h)

Irritación ocular (conejos): Moderadamente irritante

Irritación dermal (conejos): Levemente irritante

Sensibilización: No es sensibilizante

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros

METODO DE EMPLEO

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

REVELACION® 40 WP puede aplicarse hasta en dos momentos por campaña, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad la frecuencia recomendada entre aplicación es de 20 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES:

Bolsa x 100 gr
 Bolsa x 250
 Bolsa x 500 gr
 Bolsa x 1 kg
 Bolsa x 20 Kg
 Bolsa x 25 Kg

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/200L	Kg/Ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	100 - 150	-	5	0.05
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	100 - 150	-	15	0.03
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	100 - 150	0.18-0.30	7	0.06
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	100	-	14	0.03
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.4*	3	1
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.25	14	1
Zapallo	Oidium	<i>Erisiphe cichoracearum</i>	50 - 60	-	0	0.20

*Gasto de agua: 400 Litros

PC.: Periodo de Carencia.

LMR.: Límite Máximo de Residuos

Fecha de actualización: Febrero del 2026

Elaborado por el Área de Registros